

AXOL[®] PROCTO CREAM

Krēms Axol Procto Cream

AR HEMOROĪDIEM SAISTĪTO SIMPTOMU MAZINĀŠANAI.

Axol[®] Procto Cream ir krēms, kas palīdz mazināt ar hemoroīdiem saistītos simptomus. **Axol[®] Procto Cream** mazina niezi un dedzināšanu, nodrošina atsvaidzinošu un mīkstināšu iedarbību, sniedzot atvieglojuma sajūtu un nomierinot skartās vietas.

Tas novērš arī perianālās zonas kairinājumu un pietūkumu. Turklāt tas darbojas kā lubrikants, veidojot mehānisku barjeru, kas pasargā audus no berzes vēdera izejas laikā.

Axol[®] Procto Cream ir indicēts:

- anālās atveres un taisnās zarnas varikozes izraisīto problēmu gadījumā;
- hemoroīdu gadījumā;
- proktīta izraisītas niezes, dedzināšanas un sāpju gadījumā;
- kairinājuma un pietūkuma novēršanai perianālajā zonā.

Iepakojums

40 ml alumīnija tūbiņa ar endorektālo kanulu.

Sastāvdaļas:

Dejonizēts ūdens (*Aqua*), C12-20 skābes PEG-8 esteris, alkil (C12-15) benzoāts, glicerīns, ftalimidoperoksikaproskābe, dimetikons, *Butyrospermum Parkii* (karitē) sviests, glicerilsteārs, PEG-100 steārs, benzilalkohols, kaprilglicerīds, *Oryza Sativa* (rīsu) ciete (*Oryza Sativa* ciete), hidroģenētas cietes hidrolizāts (sorbīts), propilēnglikols, ūdens (*Aqua*), poliakrilskābe/karbomērs, trietanolamīns, glikozaminoglikāni, dinātrija EDTA, escīns, mentols, kālija sorbāts, nātrija benzoāts, hlorheksidīna diglikonāts, pantenols, cipreses lapu eļļa, limonēns, (vīnogu) lapu ekstrakts (*Vitis Vinifera* lapu ekstrakts), *Mimosa Tenuiflora* mizas ekstrakts, *Vaccinium Myrtillus* (melleņu) augļu ekstrakts, *Citrus Nobilis* (mandarīnu) eļļa (*Citrus Nobilis* eļļa), alantoīns, gliciretīnskābe, pentilēnglikols, linalools.

Iekšējai lietošanai

- 1) Atveriet tūbiņu.
- 2) Noņemiet kanulas vāciņu.
- 3) Uzskrūvējiet kanulu uz tūbiņas un uzklājiet krēmu endorektālajā zonā pēc nepieciešamības.
- 4) Pēc lietošanas noņemiet kanulu no tūbiņas, noskrūvējot to un nomazgājiet ar neitrālām ziepēm zem karsta ūdens.
- 5) Aizveriet tūbiņu.

Līdzeklis ir paredzēts lietošanai pēc vēdera izejas. Lietojot nepārtraukti, procedūru var atkārtot 2/3 reizes dienā. Nelietot ilgāk par 30 dienām.

Uzmanību! Lai novērstu berzes izraisītu kairinājumu, produktu var lietot pirms vēdera izejas.

Nepārsniedz ieteicamo dienas devu. Nelietot paaugstinātas jutības gadījumā pret vienu vai vairākām sastāvdaļām.

Ilgstoša vietēja produkta lietošana var izraisīt sensibilizāciju un simptomu pastiprināšanos. Šādā gadījumā pārtrauciet lietošanu un informējiet ārstu. Konsultējieties ar ārstu pirms lietošanas grūtniecības laikā.

Brīdinājumi

Nav ziņu par izraisītām blakusparādībām vai alerģiskām reakcijām. Jebkādu blakusparādību gadījumā nekavējoties informējiet savu ārstu vai farmaceitu.

Glabāt vēsā un sausā vietā istabas temperatūrā (15-25°C). Sargāt no karstuma. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nenorīt. Norīšanas gadījumā konsultējieties ar ārstu. Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi nomazgājiet kanulu karstā ūdenī.

Neto masa: 40 ml

Rev. 03/2022



0425

AXOL[®] PROCTO CREAM

„Axol Procto“ kremas

HEMOROJAUS SIMPTOMAMS MALŠINTI

„Axol[®] Procto“ kremas padeda sušvelninti hemorojaus keliamus nemalonius pojūčius. „Axol[®] Procto“ kremas ramina peršėjimą ir deginimą, suteikia gaivinamąjį ir drėkinamąjį poveikį, todėl paveiktose srityse jaučiamas palengvėjimas ir užtikrinama gera savijauta. Jis taip pat apsaugo nuo perianalinės srities dirginimo ir perštėjimo. Be to, naudojant kremą susidaro mechaninio poveikio barjeras, apsaugantis audinius nuo trinties tuštinimosi metu.

„Axol[®] Procto“ kremas skiriamas:

- esant tiesiosios žarnos ir išangės kraujagyslinių audinių išvešėjimui;
- esant vidiniam ir išoriniam hemorojui;
- esant proktitui, pasireiškiančiam perštėjimu, deginimu ir skausmu;
- siekiant išvengti stipresnio sudirginimo ir kongestijos perianalinėje srityje.

Pakuotė

40 ml aliuminio tūbelė su endorektaline kaniule.

Sudedamosios dalys:

Dejonizuotas vanduo (*Aqua*), C12-20 rūgščių PEG-8 esteris, C12-15 alkilo benzoatas, glicerinas, ftalimidoperoksikaproinė rūgštis, dimetikonas, (*Butyrospermum Parkii*) taukmedžių sviestas, glicerilo stearatas, PEG-100 stearatas, benzilo alkoholis, kaprilo / kapriko trigliceridas, (*Oryza Sativa*) ryžių krakmolos, hidrintas krakmolo hidrolizatas (sorbitolis), propilenglikolis, vanduo, poliakrilo rūgštis / karbomeras, trietanolaminas, glikozaminoglikanai, dinatrio EDTA, escinas, mentolis, kalio sorbatas, natrio benzoatas, chlorheksidino digliukonatas, pantenolis, visžalių kiparisų (*Cupressus Sempervirens*) lapų aliejus, limonenas, vynuogių (*Vitis Vinifera*) lapų ekstraktas, siauraziedžių mimozų (*Mimosa Tenuiflora*) žievės ekstraktas, juodauogių mėlynių (*Vaccinium Myrtillus*) vaisių ekstraktas, karališkųjų mandarinų (*Citrus Nobilis*) aliejus, alantoinas, gliciretino rūgštis, pentilenglikolis, linalolis.

Vidiniam naudojimui

- 1) Atidarykite tūbelę.
- 2) Nuimkite kaniulės dangtelį.
- 3) Prisukite kaniulę prie tūbelės ir išspauskite reikiamą kiekį kremo į endorektalinę zoną.
- 4) Panaudoję atsukite kaniulę nuo tūbelės ir išplaukite ją neutraliu muilu po karšto vandens srove.
- 5) Uždarykite tūbelę.

Produktą naudokite po tuštinimosi. Procedūra gali būti kartojama 2/3 kartus per dieną be pertraukų. Nevartokite ilgiau kaip 30 dienų.

Dėmesio, kad būtų išvengta sudirginimo trinant, produktas gali būti naudojamas prieš tuštinimąsi.

Neviršykite rekomenduojamos dozės. Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas vienai ar kelioms sudedamosioms dalims. Ilgainiui produkto naudojimas vienoje vietoje gali sukelti jautrumą, tai gali sustiprinti simptomus. Tokiu atveju nutraukite gydymą ir informuokite gydytoją. Pasitarkite su gydytoju prieš naudojamos nėštumo metu.

Įspėjimai

Šalutinių poveikių ar alerginių reakcijų nėra nustatyta. Jei pastebėsite šalutinių poveikių, nedelsdami praneškite gydytojui arba vaistininkui.

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, kambario temperatūroje (15-25 °C). Saugokite nuo šilumos šaltinių. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nerarykite. Jei prarijote, kreipkitės į gydytoją. Po bet kokio naudojimo endorektalinę kaniulę kruopščiai nuplaukite karštu vandeniu.

Grynasis svoris: 40 ml

Rev. 03/2022



0425

MAR-FARMA SRL, Via Melzi d'Eril 20 - Milano, ITALIA www.mar-farma.it

Platintojas Lietuvoje: ELVIM LTD, Kurzemes pr.3G, LV-1067 Ryga, Latvija, tel.:+371 67808440